

試管週期-短療程 (月經第 2 天起開始用藥)

植入時間為取卵後 2-5 天左右, 由醫師決定.

	月經第 1 天	第 2 天	第 3 天	4	5	6	7	8	9	10	11	12	取卵前 1 天	取卵當天中午到 空腹 8 小時	取卵後 1 天	取卵後 2 天	取卵後 3 天	取卵後 4 天	取卵後 5 天	6	7	8	9	10	11	12	13	取卵後 14 天	取卵後 16 天	取卵後 23 天	取卵後 30 天		
														看受精	胚胎植入	胚胎植入		胚胎植入										抽血驗孕	抽血驗孕	看胚胎	看心跳		
抽血		抽血				抽血		抽血		抽血		抽血															HCG	HCG	HCG				
超音波		超音波				超音波		超音波		超音波		超音波															看報告		超音波	超音波			
噴藥		噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴	噴																					
打針					FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH																					
破卵針													◎			○			○														
胚胎植入																	植入		植入														
術後藥													■	■	■	■																	
黃體素-快孕隆 Crinone 8% (塞)													晚 1	晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1
黃體素-優潔通 Utrogestan (口服)														早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1		
雌激素 Estrade (口服)															早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	

註: 抽血/超音波/打針劑量依個人實際追蹤狀況決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 抽血請早上 9 點前抽好. 晚上 4-5 點後回診照超音波. (請記得帶抽血單).

註: 噴藥(舒培盟)從月經第 2 天晚上開始噴及睡前, 隔天開始改 1 天 4 次, 每次噴左右鼻孔各 1 下.(吸入式) 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: ◎ 破卵針 hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾) ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3 天打 1 次, 共打 3 次, 固定時間打) 請照醫師指示.

註: 黃體素連續用 14 天以上到抽血驗孕 β-HCG 當天, 未孕即可停止; 若懷孕則繼續使用到穩定. 註: ■ : 取卵術後藥有 3 種(止痛藥 / 抗生素 / 胃藥) 3 天份要按時吃完.

註: 注意卵巢過度刺激 可能發生於取卵後, 卵子較多的較容易發生, 請記得每天多補充水分及蛋白質. 若喝 2000cc 的水分, 尿出來約要 1500cc.

若尿量少於 500cc 以上, 或腹痛腹漲請馬上回診.

試管週期-拮抗劑療程 (月經第 2 天起開始用藥)

植入時間為取卵後 2-5 天左右, 由醫師決定.

	月經第 1 天	第 2 天	第 3 天	4	5	6	7	8	9	10	11	12	取卵前 1 天	卵當天中午到 空腹 8 小時	取卵後 1 天	取卵後 2 天	取卵後 3 天	取卵後 4 天	取卵後 5 天	6	7	8	9	10	11	12	13	取卵後 14 天	取卵後 16 天	取卵後 23 天	取卵後 30 天			
														看受精情形	胚胎植入	胚胎植入		胚胎植入										抽血驗孕	抽血驗孕	看胚胎	看心跳			
抽血		抽血				抽血		抽血				抽血															β-HCG	β-HCG	β-HCG					
超音波		超音波				超音波		超音波		超音波		超音波															看報告		超音波	超音波				
打針		FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH	FSH																						
拮抗劑						Cet	Cet	Cet	Cet	Cet	Cet	Cet																						
破卵針													◎			○			○															
胚胎植入																	植入		植入															
術後藥														■	■	■	■																	
黃體素-快孕隆 Crinone 8% (塞)														晚 1	晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1	早 1 晚 1
黃體素-優潔通 Utrogestan (口服)															早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	早 1 中 1 晚 1	
雌激素 Estrade (口服)																早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3	早 3 晚 3

註: 抽血/超音波/打針劑量依個人實際追蹤狀況決定. 請依照醫師指示開始用藥及停藥. 抽血請早上 9 點前抽好. 晚上 4-5 點後回診照超音波. (請記得帶抽血單).

註: 拮抗劑(Cetrotide 欣得泰) 依照卵泡大小>10 mm 決定何時開始打. 有任何問題請來電找實驗室小姐. 03-5353-532

註: ◎ 破卵針 hCG 6500IU (Ovidrel 克得諾) ○ hCG 1500 IU (Ovidrel 克得諾)(3 天打 1 次, 共打 3 次, 固定時間打) 請照醫師指示.

註: 黃體素連續用 14 天以上到抽血驗孕 β-HCG 當天, 未孕即可停止; 若懷孕則繼續使用到穩定. 註: ■: 取卵術後藥有 3 種(止痛藥 / 抗生素 / 胃藥) 3 天份要按時吃完.

註: 注意卵巢過度刺激 可能發生於取卵後, 卵子較多的較容易發生, 請記得每天多補充水分及蛋白質. 若喝 2000cc 的水分, 尿出來約要 1500cc.

若尿量少於 500cc 以上, 或腹痛腹漲請馬上回診.